

"Observer pour mieux pâture"

On attend le printemps !

Les températures matinales basses, avec des gelées, n'ont pas favorisé le départ en végétation de l'herbe. La croissance moyenne de l'herbe pour la semaine passée est de 23,4 kg MS/ha/jour en moyenne, avec des écarts importants : de 7,9 à 36.1 kg MS/ha/jour. Les sols ont du mal à se réchauffer. Même si les températures tendent à s'améliorer, elles restent basses pour la saison. On attend le démarrage de végétation observé classiquement vers le 20 Avril.

Pour ceux qui terminent le premier cycle de pâture :

Dans les élevages où la mise à l'herbe a pu se faire relativement tôt, les hauteurs d'herbe de sortie de parcelle de 4 à 4,5 cm et la faible croissance de l'herbe en ce début d'année contraignent à revenir sur des parcelles où les hauteurs d'herbe sont faibles.

Si le stock d'herbe des parcelles pâturées ne permet pas de respecter des temps de repousse suffisants, il est préférable de réduire le temps de présence au pâturage et de continuer à distribuer des fourrages conservés pour préserver le niveau de production des prairies. On peut aussi pâturer des surfaces destinées à la fauche, ce qui devrait permettre d'améliorer par la suite la qualité du fourrage fauché.

L'objectif, aujourd'hui, est de ralentir l'avancement des vaches dans le circuit pâturage pour viser des hauteurs d'herbe à l'entrée de parcelle de 11 à 13 cm.

Pour ceux qui n'ont pas fini le déprimage :

Il est urgent de terminer le premier cycle de pâture pour pouvoir maîtriser l'explosion d'herbe à venir. Les graminées précoces sont en cours de montaison (vulpin des prés) et les refus de l'automne et les zones de déjections sont déjà développés. Un pâturage ras est urgent pour éliminer ces zones et garder une bonne valeur alimentaire aux cycles suivants.

Il est important de bien gérer la distribution de fourrages conservés : elle doit être réduite le matin pour inciter les vaches à pâturer et consommer ces zones moins appétentes.




Le dactyle est une graminée qui pousse en touffe et se lignifie rapidement si elle est refusée. Il doit être pâturé rapidement pour stopper l'engrangement des refus.

Conseils du moment

- Pâturer ras (4,5 cm).
- Ajuster la distribution de fourrage conservé au stock d'herbe disponible.
- Réduire la complémentation azotée en fonction du pourcentage de maïs distribué.
- Finir le premier cycle de pâturage.
- Mettre une fertilisation azotée après le passage des animaux.
- Semer les prairies de printemps (RGA + TB).
- Mettre à l'herbe les génisses.
- Prévoir un plan de prévention du parasitisme des génisses de première année d'herbe.

Anastasia FESNEAU -
"Opération réalisée
en collaboration avec
Agricoles de la

Avec la participation financière du



Bernard HOUSSIN
par la Chambre d'Agriculture,
Littoral Normand et les Lycées
Manche"

Conseil Général de la Manche

Croissance observée et indicateurs de gestion du pâturage

MORVILLE

Date de mise à l'herbe : 02 avril

Croissance moy. de l'herbe : 16,8 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 6,9 cm

Quantité fourrage distribuée: 16 kg MS

Surface par VL : 26 ares

MORVILLE

Date de mise à l'herbe : 02 avril

Croissance moy. de l'herbe : 16,8 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 6,9 cm

Quantité fourrage distribuée : 16 kg MS

Surface par VL : 26 ares

Stock d'herbe par VL : 16 kg MS

PONT-HEBERT

PONT-HEBERT "45 ares"

Date de mise à l'herbe : 2 avril

Croissance moy. de l'herbe : 19,7 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 7,5 cm

Quantité fourrage distribuée: 10 kg MS

Surface par VL : 45 ares

LE HOMMET D'ARTHENAY

Date de mise à l'herbe : 30 mars

Croissance moy. de l'herbe : 0.1 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 8,8 cm

Quantité fourrage distribuée : 13 kg MS

Surface par VI : 30 ares

PONT-HEBERT "15 ares"

Date de mise à l'herbe : 2 avril

Croissance moy. de l'herbe : 12,5 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 7,7 cm

Quantité fourrage distribuée : 10 kg MS

Surface par VL : 15 ares

LE LOREUR

Date de mise à l'herbe : 23 Mars

Croissance moy. de l'herbe : 7,9 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 7,2 cm

Quantité fourrage distribuée : 12 kg MS

Surface par VL : 20 ares

ST JEAN DU CORAIL

Date de mise à l'herbe : 28 Mars

Croissance moy. de l'herbe : 36,1 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 6,6 cm

Quantité fourrage distribuée : 12 kg MS

BARENTON

Date de mise à l'herbe : 22 Mars

Croissance moy. de l'herbe : 32,8 kg MS/j/ha

Hauteur d'herbe moyenne : 6,2 cm

Quantité fourrage distribuée : 10 kg MS

Surface par VL : 30 ares