

"Observer pour mieux pâturer"

Une pousse moyenne de 55.35 kg MS/ha/jour cette semaine

Avec le temps doux et ensoleillé prévu pour cette semaine, le niveau de croissance de l'herbe devrait confirmer son augmentation.

Les épis montent, récoltez de la qualité

On commence à observer les sorties d'épis pour les dactyles sauvages et les ray-grass les plus précoces.

Les ensilages de dérobées ont commencé. Le temps doux de l'hiver a permis d'avoir un gros volume et il ne faut pas attendre l'épiaison des RGI pour garder une bonne valeur alimentaire. Au stade montaison, on aura la valeur alimentaire optimale du fourrage.



Rappel des dates clefs pour vos prairies

RGI et trèfle d'alexandrie

Le tableau qui suit vous permet d'avoir des repères pour la gestion du pâturage et des récoltes de fourrage.

Stade de la végétation	Départ de la pousse	Epi 5 cm	Début épiaison	Pleine épiaison	Pleine floraison
Utilisation optimale de la prairie	Mise à l'herbe possible	Fin du déprimage	Ensilage, enrubannage, fauche précoce	Foin précoce	Foin tardif
Prairie temporaire fertile et précoce à base de ray-grass...	250°C	500°C	700°C	1 000°C	1 200°C
Prairie temporaire fertile à base de dactyle, fétuque élevée...	300°C	550°C	800°C	1 100°C	1 300°C
Prairie permanente et temporaire tardive	400°C	600°C	1 200°C	1 400°C	1 600°C

Source : INRA de Toulouse

Le tableau suivant vous indique la somme des températures cumulées du 1^{er} février au 13 avril 2014, pour 3 stations météo du nord, centre et sud du département.

Sur les zones côtières, la somme des températures atteint bientôt les 700°C cumulés. C'est le repère pour récolter des ensilages de qualité pour les prairies temporaires.

Commune	Somme des T°C (du 1^{er} février au 13 avril 2014)
Auderville	665°C
Cerisy-la-salle	612°C
Pontorson	638°C

Avec une forte croissance de l'herbe en ce début de printemps, due à des températures supérieures à la moyenne, il est important de réfléchir d'ores et déjà aux parcelles qu'on écartera du circuit de pâturage pour la fauche, pour ne pas se laisser « déborder » par l'herbe.

Un tour de parcelles permet de repérer les parcelles mal pâturées, où des épis apparaissent et de les débrayer en priorité. C'est le cas pour les parcelles où les hauteurs d'herbe sont supérieures à 12-13 cm (au-dessus du niveau de la cheville) où on aura une moins bonne ingestion par les vaches. Privilégiez une fauche précoce pour une repousse rapide au cycle suivant.

Source : Météo France

Conseil du moment

- **Débrayer les parcelles dont les hauteurs d'herbe dépassent 12-13 cm herbomètre (au-dessus du niveau de la cheville).**
- **Réduisez les quantités de maïs distribuées pour valoriser l'herbe.**

Anastasie FESNEAU, Céline PACARY
"Opération réalisée par la Chambre d'agriculture, en collaboration avec Littoral Normand et les Lycées Agricoles de la Manche"

Avec la participation financière du Conseil Général de la Manche



Croissance observée et indicateurs de gestion du pâturage

