

"Observer pour mieux pâture"

Ne pas se laisser déborder par l'herbe

L'alternance pluie et beau temps est favorable à la pousse de l'herbe qui se maintient à 65 kg MS/ha/jour, en moyenne sur le département.

Faucher de la qualité :

Les 1000 °C de somme de température moyenne journalière est dépassé cette semaine sur tout le département.

**Sommes des températures
sur 3 communes du département
depuis le 1^{er} février 2014 :**

Valognes	1106 °C
Cerisy-la-Salle	1100 °C
Pontorson	1147 °C

Source : site Météo France

Quelques repères pour faire les foins précoces :

- A 1000°C : prairies temporaires à base de ray grass anglais
- A 1100°C : prairies temporaires à base de fétuque élevée et de dactyle.
- A 1400°C : prairies permanentes tardives

Après les ensilages, le temps des foins précoces est arrivé. Les foins précoces sont pauvres en fibres et riches en sucres et en azote. Acidogène, on limitera la quantité de ce fourrage distribué et on l'associera avec un foin grossier, plus tardif et plus fibreux, qu'on distribuera en premier pour qu'il soit bien consommé et qu'il stimule la panse.

A la chasse aux épis :

Les épis des graminées les plus tardives sont en cours de montaison. D'ici 15 jours, tous les épis devront être maîtrisés, par le pâturage ou la fauche, afin d'assurer des repousses feuillues pour l'été.

Pour couper l'épi au pâturage, il faut être vigilant sur les hauteurs de sortie de parcelles et pâturer ras (5 cm). Ce n'est pas toujours facile surtout quand les hauteurs en entrée de parcelle sont élevées, ce qui est le cas en ce moment. N'hésitez pas à utiliser un fil avant pour obliger les vaches à pâturer ras pendant cette période de forte pousse, sans gâcher de l'herbe.

La gestion des refus :

L'apparition de refus est souvent causée par une mauvaise maîtrise des épis et des hauteurs en sortie de parcelle trop élevées. Même si les vaches manifestent leur mécontentement au début, il faut les obliger à finir les parcelles et pâturer ras, pour éviter d'avoir à faucher les refus et de gaspiller herbe et gasoil. Même si on voit une baisse de lait au tank en fin de

paddock, c'est du fourrage et de la production de lait en plus pendant l'été et un gain économique global sur l'année.

Dans les cas où l'épi n'a pas été maîtrisé, fauchez les refus le plus tôt possible pour favoriser les repousses feuillues et limiter la montée en graines des rumex et des chardons. Pour valoriser l'herbe fauchée, laissez la sécher un jour ou deux, et faites la consommer par des génisses ou des taries. Préférez la faucheuse au broyeur qui lacère les feuilles.

Conseil du moment

- **Pâturez ras (hauteur sortie : 5 cm) pour maîtriser les épis.**
- **Fertilisez les prairies peu fournies en trèfle, surtout après une fauche.**
- **Fauchez les excédents.**

Anastasie FESNEAU, Céline PACARY
***"Opération réalisée par la Chambre d'agriculture, en collaboration avec Littoral
Normand et les Lycées Agricoles de la Manche"***

Avec la participation financière du Conseil Général de la Manche



Croissance observée et indicateurs de gestion du pâturage

Pousse moyenne : 65 kg MS

MORVILLE

Croissance moyenne de l'herbe : 109 kg MS/J/ha
23 ares/VL
Stock d'herbe par VL : 217 kg MS
17 jours d'avance

LE HOMMET D'ARTHENAY

Croissance moyenne de l'herbe : 96 kg MS/J/ha
27 ares/ VL
Stock d'herbe par VL : 300 kg MS
25 jours d'avance

PONT-HEBERT "45 ares"

Croissance moyenne de l'herbe : 36 kg MS/J/ha
45 ares/VL
Stock d'herbe par VL : 195 kg MS
13 jours d'avance

COUTANCES

Croissance moyenne de l'herbe : 48 kg MS/J/ha
32 ares/VL
Stock d'herbe par VL : 255 kg MS
18 jours d'avance

PONT-HEBERT "15 ares"

Croissance moyenne de l'herbe : 34 kg MS/J/ha
15 ares / VL
Stock d'herbe par VL : 63 kg MS
8 jours d'avance

LE LOREUR

Croissance moyenne de l'herbe : 78 kg MS/J/ha
22 ares /VL
Stock d'herbe par VL : 257 kg MS
26 jours d'avance

ST JEAN DU CORAIL

Croissance moyenne de l'herbe : 51 kg MS/J/ha
20 ares/ VL
Stock d'herbe par VL : 140 kg MS
9 jours d'avance

BARENTON

Croissance moyenne de l'herbe : 61 kg MS/J/ha
27 ares/ VL
Stock d'herbe par VL : 235 kg MS
14 jours d'avance